VPC20 VPC15 VPC13 VPC10 VPP23

ESQUEMAS DE
ESQUEMAS DE
VACINAS PNEUMOCÓCIAS

Edição digital de 17.06.2025



ESQUEMAS DE VPC20, VPC15, VPC13 OU VPC10 NA ROTINA DE CRIANÇAS SAUDÁVEIS

7/06/2025

VPC20

OU

Esquema 3+1

2, 4, 6 meses e uma dose de reforço entre 12 e 15 meses de idade.

VPC15 ou VPC13

Crianças saudáveis com esquema completo com a VPC13 não necessitam revacinar com a VPC20 ou VPC15.

As vacinas VPC20, VPC15 e VPC13, são intercambiáveis.

VPC10

Esquema 2+1 (PNI) 2, 4 meses e uma dose de reforço aos 12 meses de idade.

Crianças menores de 6 anos com esquema completo ou incompleto de VPC10 se beneficiarão de dose(s) adicional(is), preferencialmente, com as vacinas VPC20 ou VPC15. Na impossibilidade, utilizar a VPC13.

ESQUEMAS VACINAS PNEUMOCÓCICAS EM SITUAÇÕES ESPECIAIS

Esquemas de VPC20, VPC 15, VPC13 e VPP23 recomendado para portadores de comorbidades de risco para doença pneumocócica invasiva (DPI) a partir de 2 anos de idade.

VPC20 Dose única

OU esquema sequencial:

VPC15 Intervalo mínimo de 2 meses VPP23 VPP23

VPP23 somente a partir de 2 anos de idade.

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/72/rr/rr7203a1.htm#T1_down

(CONT)

ESQUEMAS VACINAS PNEUMOCÓCICAS EM SITUAÇÕES ESPECIAIS

Esquemas de VPC20, VPC 15, VPC13 e VPP23 recomendado para portadores de comorbidades de risco para doença pneumocócica invasiva (DPI) a partir de 2 anos de idade.

Vacinação incompleta, de acordo com histórico vacinal. VPP23 somente a partir de 2 anos de idade.

Intervalo ≥1 ano VPP23 VPC20 Dose única Intervalo 2 meses VPC15 Dose única VPC20 ou VPC13 Intervalo Intervalo mínimo de 2 meses ≥1 ano VPC15 VPP23 VPC20 Dose única ou VPC13 OU Intervalo ≥5 anos **VPP23*** Intervalo Intervalo ≥5 anos ≥1 ano VPP23 VPP23 VPC20 Dose única OU VPC15 Dose única

ou VPC13

^{*} Se a segunda dose de VPP23 foi aplicada antes de 65 anos, fazer uma terceira dose cinco anos após, mantendo intervalo mínimo de dois meses das vacinas conjugadas VPC15 ou VPC13.

ESQUEMAS VACINAS PNEUMOCÓCICAS EM SITUAÇÕES ESPECIAIS

Esquemas de VPC20, VPC 15, VPC13 e VPP23 recomendado para portadores de comorbidades de risco para doença pneumocócica invasiva (DPI) a partir de 2 anos de idade.

Vacinação completa (a critério médico) VPP23 somente a partir de 2 anos de idade.

3/02/2075





Intervalo

